

## **Informatie na chirurgie van een implantaat met botopbouw**

U heeft een chirurgische ingreep gehad waarbij de implantoloog een implantaat heeft geplaatst en tegelijkertijd een botopbouw heeft aangebracht. Het is van groot belang dat de genezing ongecompliceerd verloopt. Indien er een bacteriële infectie optreedt in de wond dan gaat de opbouw meestal verloren. Indien de wondgenezing ongestoord verloopt dan is hier het minste risico op. U kunt zelf bijdragen aan een ongecompliceerde genezing door u aan onderstaande voorschriften te houden.

- Er zal een flinke zwelling en verkleuring optreden, schrik hier niet van. Na verloop van tijd kan de zwelling via de hals wegzakken en daarmee ook de verkleuring.
- Blijf van de hechtingen af met tong of vingers. U mag niet de lip optillen om de wond te inspecteren, u trekt dan aan de wondranden. Elke tensie op de wond kan een complicatie veroorzaken.
- De eerste 24 uur na een ingreep moet u geen hete, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. Om de wond te ontzien, kunt u de eerste dagen na de ingreep beter geen hard of kruimelig voedsel eten.
- De eerste twee weken niet roken. Dit is slecht voor de wondgenezing (desnoods nicotinepleisters gebruiken).
- De wond geneest het beste als het bloed goed kan stollen. Daarom mag u de eerste 24 uur de mond niet spoelen.
- Een schone mond geneest beter dan een vieze. De dag na de behandeling kunt u uw tanden en kiezen weer normaal poetsen. Het wondgebied niet poetsen.
- Slaap de eerste dagen op een hoger hoofdkussen en slaap niet op de geopereerde zijde.
- Houd u aan de voorschriften van antibioticagebruik.
- Meestal heeft de behandelaar u een mondspoelmiddel voorgeschreven (Chloorhexidine); 1 dag na de behandeling beginnen met 3 maal daags spoelen, gedurende twee weken.
- Het is normaal dat u pijn heeft na de behandeling. U kunt de pijn bestrijden met Paracetamol. Zo nodig schrijft de behandelaar u andere pijnstillers voor. De plaatselijke verdoving is na ongeveer twee tot vier uur uitgewerkt.
- Een beperkte mondopening komt na een operatieve ingreep vaak voor. Na enige dagen is de mondopening weer normaal. U kunt door oefening proberen de mond steeds verder te openen.
- Indien u een ijszak heeft gekregen, kunt u deze tegen de wang aanhouden tot het moment dat hij niet meer koelt. Desgewenst kunt u doorgaan met koelen door iets uit de vriezer te gebruiken. Let hierbij wel op dat u het product in een doek wikkelt en niet langer dan 10 min. aaneengesloten koelt. Dus 10 min koelen, 5 min. rust afwisselen.
- Indien u een uitneembare prothese(kunstgebit of frameprothese) heeft, mag u deze pas dragen nadat hij is aangepast door de behandelaar.
- Prothese alleen gebruiken voor cosmetische doeleinden (max. 2 uur per dag) en er vooral niet mee kauwen/bijten.
- De prothese zeker 's-nachts niet dragen en de eerste week zonder prothese eten.

### **Zwelling**

Een dikke wang en een blauwgele verkleuring zijn normaal. Dit begint meestal 1 á 2 dagen na de ingreep. De zwelling is na twee dagen op zijn hoogtepunt en neemt daarna geleidelijk weer af. Als dit niet het geval is, moet u contact opnemen.

### **Koorts**

Koorts, zelfs tot 39°C, is gedurende de eerste dag normaal. Krijgt u plotseling hoge koorts boven 39°C of blijft de koorts boven 38,5°C langer dan 2 dagen bestaan, neem dan contact op.

### **Nabloeding**

Gedurende de eerste dagen kunnen bloedstolsels het speeksel rood kleuren. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat er sprake is van een nabloeding. Dit is echter zelden het geval. Probeer een eventuele bloeding te stoppen door een opgevouwen gaasje (géén watten) op de wond te leggen en hier 60 minuten op te bijten; zo nodig herhalen. Bij een nabloeding is er meer bloed dan speeksel in de mond. In dat geval neemt u contact op.

### **Hechtingen**

U krijgt een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen. Dit is meestal twee weken na de behandeling.